В залежності від m^* напівпров. може змінювати свою форму.

З книжки Харріса (Теорія тв. тіла):


$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{f(p,q)}_{\text{розподіл за енергією}} \mathcal{H}(p,q)\, d^3p\, d^3q$$

Якщо дія е/м. поля зводиться до:

$$\frac{p^2}{2m^*} \Rightarrow \frac{1}{2m^*}\left(p - \frac{e}{c}A(r)\right)^2 + \mathcal{H}_{spin}$$

$$p \to p' = \left(p - \frac{e}{c}A(r)\right); \quad dp = dp'$$


Якщо $f(p,q)$ не змінюється, то ефект зміна можлива



Поле, індуковане в кільці буде відрізнятися від того, що є зовні.

$$E_H = \frac{1}{8\pi}\int \underbrace{\left(H - H'(r)\right)^2}_{= H^2 + H'(r)^2 + 2HH'(r)} d^3r$$

В книжці совпадуються до енергії полів зовні та в середині компенсують один одний і інтеграл буде $= 0$.



Поле зовні буде компенсувати те, що є на границі.

В разі квантування функції розподілу квантується, результати змінюються.

$$\mathcal{H} = \frac{1}{m^*}\left(\vec{p}^2 - \frac{e}{c}\vec{A}(r)\right)^2, \quad \vec{B} = \mathrm{rot}\,\vec{A}$$

$\vec{B}$ і $\vec{H}$ можна зберігувати, на відміну від $\vec{A}$.

$\mathrm{rot}(\mathrm{grad}\, m) = 0$, m-скаляр (загальне правило)

Тому при переході $A \Rightarrow A' + \mathrm{grad}\, m$, кажуть, що векторний потенціал задається з точністю до калібровки

$A = \frac{1}{2}[\vec{H} \times \vec{r}]$ – симетрична калібровка

$A = \vec{H} \times \vec{e}_j$ – використав вибір Ландау

$\frac{1}{2}\{(-H_2 y, H_2 x, 0)\}$ $\quad H = (0,0,H_z)$

$A = \vec{H} \times \vec{e}_y \to \{0, H_1 x, 0\}$ $\quad$ §6, §7 (додатні задачі)

03.03

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m^*}\left(p^2 - \frac{e}{c}\vec{A}\right)^2 \qquad \underbrace{\vec{A} = \frac{1}{2}[\vec{H} \times \vec{r}]}_{\text{симетрична калібровка}}$$

$$\vec{A} = \left\{-\frac{1}{2}H_z y + \frac{1}{2}H_z x, 0\right\}$$

Ландау сам придумав потенціал $\vec{A} = \{0, H_z x, 0\}$

Циклотронна частота: $\omega_c = \frac{eH}{m^* c}$; $H_z = \omega_c m^* \cdot \frac{c}{e}$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m^*}\left\{\left(p_x + \frac{1}{2}m^* y \omega_c\right)^2 + \left(p_y - \frac{1}{2}m^* x \cdot \omega_c\right)^2\right\} + \frac{p_z^2}{2m^*}$$

Бачимо, що p_y в напрямку z не змінився,

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m^*}\left\{\underbrace{\left(p_x^2 + p_z^2\right)}_{p_x^2} + \underbrace{\frac{m^{*2}\omega_c^2}{4}\left(x^2+y^2\right)}_{\rho^2} + m^*\omega_c\underbrace{\left(yp_x - xp_y\right)}_{-\hbar L_z}\right\} + \frac{p_z^2}{2m^*}$$

$$\frac{1}{2m^*}p_x^2 + \left(\frac{m^{*2}\omega_c^2}{8}\right)\rho^2$$ — стандартне рівняння для квантового осцилятора в площині

$$E_n = \underbrace{2\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega_c}_{} + \frac{p_z^2}{2m^*}$$ ← оптимальні квантування

$$\mathcal{H} \to \frac{1}{2m^*}p_x^2 + \frac{m^*\omega_c^2}{8}\rho^2 - \hbar L_z$$

Розглянемо векторний потенціал Ландау:

$$\frac{1}{2m^*}\left(\frac{\hbar}{i}\nabla - \frac{e}{c}A\right)^2\Psi = E\Psi \quad \leftarrow \vec{A} = \{0, Hx, 0\}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial}{\partial y} - \frac{ieHx}{\hbar c}\right)^2\Psi + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} + \frac{2m^*E}{\hbar^2}\right) = 0$$

$$\Psi(x,y,z) = e^{i(\beta y + k_z z)}\cdot U(x), \quad \beta = k_y$$

$$\frac{\partial^2 U(x)}{\partial x^2} + \left\{\frac{2m^*E'}{\hbar^2} - \underbrace{\left\{\beta - \frac{eH}{\hbar c}\cdot x\right\}^2}_{(x_0 - x)^2\left(\frac{\hbar c\beta}{eH}\right)^2}\right\}U_x = 0$$

$$\frac{\hbar c\beta}{m^* eH}\cdot m^* = \hbar\omega_c\cdot\frac{\beta}{m}, \quad x_0 = \hbar\omega_c\frac{\beta}{m^*} = \frac{\hbar\beta}{m^*}\cdot\frac{1}{\omega_c}$$

Ландау виходив до висновку, що відбувається коливання з ω_c навколо x_0.

$$\frac{\hbar k_y}{m^*} = \frac{m^* v_y}{m^*} = v_y; \quad \underbrace{x_0 = \frac{\hbar k_y \cdot m^* c}{m^* eH}}_{x_0 = f(k_y)}$$

a_x, a_y $\left(\frac{a_y}{2\pi}\right)$ $0 < x_0 < a_x$ ← густина станів на одиницю довжини в y-просторі.

$$k_y = \frac{eH}{\hbar c}\cdot x_0; \quad 0 < k_y < \frac{a_x \cdot eH}{\hbar c}$$

$$\boxed{p = \frac{a_y \cdot a_x \cdot eH}{\hbar\cdot 2\pi\cdot c} = \frac{S\cdot H}{4c/e} = \frac{\Phi}{\Phi_0}}$$ ← кількість станів на орбіті Ландау

Φ_0 — квант магнітного потоку

Коливання в точці x_0 залежить від k_y.

Магнітний потік у вакуумі не квантується, бо там немає заряджених частинок.

Квантована циклотронна орбіта, по якій рухається електрон, діляться тим, щоб зміна від електрона в полі дорівнювала 2π.

$\boxed{\Phi_0 = \frac{hc}{e}}$ — магнітний потік



Кількість станів р для урахування спіна можна домножити на 2. На кожній з орбіт буде однакова кількість станів

$$\Delta S = p\cdot\frac{a_x a_y}{4\pi^2} = \frac{a_x a_y \cdot eH}{hc\, a_x a_y}\cdot 4\pi^2 = \frac{2eH}{\hbar c}\cdot\pi$$

$$S_n = \frac{2eH}{\hbar c}\left(n+\gamma\right) = \frac{eH}{\hbar c}2\left(n+\frac{1}{2}\right) \leftarrow \gamma = \frac{1}{2}$$

додаткові стани (імпульсний доданок)

Ця формула справедлива для сферичного рівня Фермі.

$\pi \rho_{kn}^2 = \frac{eH\pi}{\hbar c} 2\left(n+\frac{1}{2}\right)$ — ρ_{kn} — радіус n-ї орбіти

$(r_n \omega_c)^2 = \left(\frac{\rho_{kn}\hbar}{m^*}\right)^2$; $r_n^2 = \frac{\rho_{kn}^2 m^{*2} c^2}{m^{*2} \cdot e^2 H^2} =$

$= \frac{eH c^2}{\hbar c e^2 H^2} \cdot 2\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{\hbar c}{eH} 2\left(n+\frac{1}{2}\right) = \ell_H \cdot 2\left(n+\frac{1}{2}\right)$

ℓ_H – радіус найменшої циклотронної орбіти (ρ_{kn} при $n=0$)

$\rho_{kn}^2 = \frac{1}{\ell_H} 2\left(n+\frac{1}{2}\right)$



На кожній з орбіт частота рівна, тому чим більший радіус, тим більша швидкість. Відхід через одиничну площу

окремі величини, але зможемо на $2\left(n+\frac{1}{2}\right)$, пояснення

При збільшенні поля трубки позбуваються, і може так статись, що 0-трубка вийде за межі Ферміївської поверхні. Це вже не буде Ферміївська рідина.

Ландау довів, що тут виступає діамагнетизм.


якщо $\underbrace{kT}_{\text{середня теплова енергія рівнів}} > \hbar\omega_c$, $\underbrace{\omega_c \tau}_{\text{зміщення рівнів між фононами}} < 1$ більше як відстань між фононами

$\chi_{ze} = \underbrace{\frac{-1}{V}}_{\text{спінова сприйнятливість}} \cdot \frac{e^2}{4m^{*2}c^2} \cdot \sum [r_i] = -\frac{e^2 (N/V)}{4m^{*2}c^2} \vec{r_i} =$

$= \frac{-e^2 (N/V)}{4m^{*2}c^2 k_F^2}$ (=)

$N = \frac{2a_x a_y a_z}{8\pi^3} \cdot \frac{4\pi}{3} k_F^3$; $\frac{N}{V} = \frac{k_F^3}{\pi^2 \cdot 3}$

(=) $\frac{e^2 \cdot k_F^3}{\pi^2 \cdot 3 \cdot 4 m^{*2} c^2 k_F^2} = -\underbrace{\frac{e^2 k_F}{12\pi^2 m^{*2} c^2}}_{\text{діамагнітна сприйнятливість Ландау}}$



Ефект Де Гааза - Ван Альфена.

10.03

$\mathcal{H} = \frac{1}{2m^*}\left(P - \frac{e}{c}A\right)^2$; $\omega_c = \frac{eH}{m^* c}$

$A = \left\{-\frac{1}{2}H_y, \frac{1}{2}H_x, 0\right\}$; $H = \frac{\omega_c m^* c}{e}$

$\mathcal{H} = \frac{1}{2m^*}\left\{\underbrace{(P_x^2 + P_y^2) + \frac{m^{*2}\omega_c^2}{4}(x^2+y^2)}_{\text{2 квантових осцилятори (а не 1)}} - \underbrace{\frac{m^*\omega_c}{2}\ell_z\hbar}_{-\hbar\omega_c \ell_z}\right\} + \frac{P_z^2}{2m}$

поділ осциляторів на дві підгрупи

$\frac{1}{2m^*}P_x^2 + \frac{m^{*2}\omega_c^2}{8}x^2 + \frac{1}{2m^*}P_y^2 + \frac{\omega_c^2}{8}y^2$

$\frac{1}{2m^*}P_x^2 + m^{*2}\left(\frac{\omega_c}{2}\right)^2 x^2$ $E = \left(n_y + \frac{1}{2}\right)\cdot\frac{\omega_c}{2}$

$E = \left(n_x + \frac{1}{2}\right)\frac{\omega_c}{2}$ → додано: $E = \left(\underbrace{n_x + n_y}_{n} + 1\right)\frac{\omega_c}{2}$

$E = \left(n + 1 - \ell_z\right)\frac{\omega_c}{2} = \left(2q+1\right)\frac{\omega_c}{2}$ → $\left(7+\frac{1}{2}\right)\omega_c$

$\hat{H} = i \cdot \hbar \cdot v_F \cdot \hat{\sigma} \nabla$

$\hat{S} = \frac{1}{2}\hat{\sigma}$ — матриці Паулі

$E = \hbar \cdot v_F \cdot K$, $K = (k - k_0 i)$

$E_n = \pm\sqrt{2e\hbar v_F^2 H\left((n) + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\right)} = \sqrt{2e\hbar v_F H N}$

Для графена вводять циклотронну масу:

$m_c^* = \frac{E}{v_F^2}$ → виходить без 2 (виявилося, що це частое рівняння Дірака)



$\omega_c \tau \ll 1$

Спінова сприйнятливість Паулі

$$F(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1}$$


$$n_\downarrow = \int_0^\infty \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{в кожному стані 2 електрони}} \cdot \frac{\partial N}{\partial E} F(E - \mu_B H)\, dE$$

$$n_\uparrow = \int_0^\infty \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial N}{\partial E} F(E + \mu_B H)\, dE$$

$$(n_\downarrow - n_\uparrow) = \int_0^\infty \frac{1}{2} \frac{\partial N}{\partial E} \underbrace{\left(F(E - \mu_B H) - F(E + \mu_B H)\right)}_{-2\mu_B H \frac{\partial F(E)}{\partial E}} dE \quad (=)$$

після розкладу в ряд Тейлора до членів першого порядку

$$(=) -\mu_B H \int_0^\infty \frac{\partial N}{\partial E} \cdot \frac{\partial F}{\partial \varepsilon}\bigg|_{\varepsilon = E} dE \quad (=)$$



графен

$v_F = 10^6$ м/сек



$$(=) \mu_B H \left.\frac{\partial N}{\partial E}\right|_{E=E_F} \cdot \underbrace{\int_0^\infty \frac{dF}{d\varepsilon} d\varepsilon}_{\text{апроксимуємо } \delta\text{-функцією}} = \mu_B H \left.\frac{\partial N}{\partial E}\right|_{E=E_F}$$

$$M = \mu_B (n_\downarrow - n_\uparrow) = \mu_B^2 H \left.\frac{\partial N}{\partial E}\right|_{E=E_F}$$

$N = \frac{4}{3}\pi k^3 \cdot 2 \frac{V}{8\pi^3}$; $\frac{N}{V} = \frac{k^3}{3\pi^2}$; $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$;

$k = \sqrt{\frac{2m^* E}{\hbar^2}}$; $N = \frac{V(2m^*E)^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} = \underbrace{N_0 \cdot \left(\frac{E}{E_F}\right)^{3/2}}$

$\frac{\partial N}{\partial E} = \frac{3}{2} \cdot \frac{V(2m^*)^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} E^{1/2}$; $\frac{\partial N}{\partial E} = \frac{3}{2} N_0 \frac{E^{1/2}}{E_F^{3/2}}$

$\left.\frac{\partial N}{\partial E}\right|_{E=E_F} = \frac{3}{2} N_0 \frac{E_F^{1/2}}{E_F^{3/2}} \cdot \frac{1}{E_F} = \frac{3}{2} \cdot \frac{N_0}{E_F} = \frac{1}{2} V \cdot \frac{3}{2} \frac{\left(\frac{N_0}{V}\right)}{E_F}$

$M = \frac{3}{4} \mu_B N_0 \frac{2\mu_B H}{E_F}$; $m = \frac{M}{N_0} = \frac{3}{4}\mu_B \cdot \frac{2\mu_B H}{E_F}$

магн. момент на 1 електрон

Паулі: $\chi_P = \frac{3}{2} \frac{1}{V} \mu_B^2 V \frac{(N_0/V)}{E_F} = \frac{3}{2} \frac{e^2\hbar^2}{2m_0^2 c^2} \cdot \frac{k_F^3}{3\pi^2} \cdot \frac{2m^*}{\hbar^2 k_F^2} =$

$= \frac{e^2 k_F \cdot 3}{6 \cdot \pi^2 2c^2 m^*} \left(\frac{m^*}{m_0}\right)^2 = \frac{e^2 k_F}{4\pi^2 c^2 \cdot m^*} \left(\frac{m^*}{m_0}\right)^2$

$\chi_L = -\frac{e^2 k_F}{12\pi^2 m^* c^2}$

17.03

$\mathrm{rot}\, A = B$, $\mathrm{rot}\, H = H$, $\mu = 1$

$\iint_\Sigma \mathrm{rot}\, \vec{V}\, dS = \int_L \vec{V}\, dl$

$\iint_\Sigma \mathrm{rot}\, \vec{A}\, dS = \int_L \vec{A}\, dl = \Phi$